

★ご注意の点

- ♪投与量と注射の時間について：医師の指示に従ってください。
- ♪注射部位については、1回ごとに注射部位は変えてください、連続して同じ部位に注射しないでください。
- ♪使用済の注射針を集めて、再診の際にスタッフにお渡しください。
- ♪脂肪の多そうな所に思い切ってを刺し、薬剤を注入する時はゆっくりでのが鉄則です。

★注射の手順

1.注射の準備を行う前に必ず手を洗ってもしくはアルコール綿で消毒してください。



2.Orgalutran のキャップを引っ張って外します。

3.針先を上にして空気の泡が上がるようにシリンジを3~4回軽く弾きます。



4.その後、針先を上にして状態でプランジャーを1度ゆっくり引き、薬液をシリンジ内に移します。その際に、プランジャーを強く押しすぎると薬液が飛び出すので、ご注意ください。



5.注射部位一臍を避ける下腹部。

6.注射するエリアをつまみ上げて、アルコール綿で消毒しておく。

7.注射するエリアに針を真っ直ぐ、思い切ってを刺し、必ず全部差し込む、針をお腹に刺したまま、皮膚をつまみ上げた手を離し、その手で注射器を固定させて。



8.薬剤をゆっくり注入します、全部注入したら、針を抜きます、アルコール綿で注射部位を拭いてください。注射後、揉まないでください。

