

★ご注意の点

♪投与量と注射の時間について：医師の指示に従ってください。

♪注射部位：下腹部（臍以下）

♪注射部位については、1回ごとに注射部位は変えてください、連続して同じ部位に注射しないでください。

♪使用済の注射針を集めて、再診の際にスタッフにお渡しください。

♪脂肪の多そうな所に思い切ってを刺し、薬剤を注入する時はゆっくりでのが鉄則です。

★注射の手順

1.注射の準備を行う前に必ず手を洗ってもしくはアルコール綿で消毒してください。

2.Pergovaris 皮下注ペンのキャップを引っ張って外します。

3.カートリッジの先端のゴム先端をアルコール綿で丁寧に消毒してください。

4.投与量の設定—

♪投与量表示窓の数字が主治医から指示された単位になるまで、注入ボタンを時計回りに回して合わせます。

♪もし回しすぎてしまった場合には、逆に回して、正しい単位が表示されるまで戻してください




5.注射針の取り付け

♪注射針ケースの保護シールをヌガう剥がしてください。


♪針ケースをしっかりと持ち、Pergovaris 皮下注ペン先端のコネクタを針ケースの中に押し込み、時計方向に回して合わせて、しっかりと注射針を取り付けます。

♪針ケースを取り外します（また使用しますので、捨てないでください。）針キャップを取り外します（捨てても OK）。



1.注射部位一臍を避ける下腹部。

2.選んだ注射部位をアルコール綿で消毒します、消毒済部位に触らないでください。



3.数字が見えるように投与量表示窓を上に向けて、注射針を皮膚に刺し、注入ボタンをゆっくりと最後まで完全に押し込みます。

4.最後まで完全に押し込むと、投与量表示窓の数字が0になります。

これで設定した投与量が正しく注射できたことが確認できます。

5.注入ボタンをしっかりと押したまま、15 秒間待ちます。注入ボタンを押したまま、針を抜きます、アルコール綿で注射部位を拭いてください。



6.注射が終わったら、注射針で刺さないよう注意して針ケースをまっすぐに取り付けます。針ケースを反時計回りに回して、取り外します。Pergovaris 皮下注ペンのキャップをしてください。

